

Рвигментамбо.

Вампембис рвигментис Фюма Темрава
 Штадъ Дангора отъ 3^{го} Августа сего года
 да А 860, и въ именномъ авиисе обвигмент-
 етвовани 3^{го} Августа 1877 года, въ Каминков-
 скойс Мереконис Десниманн, составни сгаровъ
 1^{го} сруотенаро сго Императорскаго Общества
 Темрава-сдуправа Джинаова Камн-
 тана Лейтманна Франкова. Изъ предидвни-
 каро ина обвигментамбо перевидзочнаго
 пункта, указывается, что с Франкову
 29 июля ина реду, наредяе на парадогнъ Ве-
 та, въ бою съ турецкими броморцими 11^{го} ста-
 нис сего года, били ранены и ушибены, оконча-
 ни разорвавшимися неприятельскими снаря-
 довь и оторванными ими кусками дерева, при-
 чина превидени распространена въ ухаю
 и багровид пята, равно какъ и разбе ина-
 киръ части головы, груди, спины, руки и
 ноги, повреждение барабанной перепонки / сир-
 тика / правого уха, обожжение волосъ головы,
 врешнами потерь сознания, — глухота правого
 уха.

При изследовани ина наши сандураци:
 ростъ равниси 168 сантим., обаяи груди 95 сантим.,
 втос тана 120 фунт., ибичная система
 корано равниси, с Франкову указывается ре-

Бок правой половины головы, по временам
всё время сморщив и сжатие суда.

Исследование органа суда показало: это
показано по бокам правой ушной раковины,
на кости головы, при надавливании, валики шири
рубца от шейки околоковок или гребни
носа. Правый паружный сурлатеи пройти это
костно прищипать, особенно передний ступка.
На верхней ступке, показана у входа в суд
ловую грядку, надобная кадушка. На передней
ступке, показана впереди прищипки,
баранной перепонки, ограниченная прищип-
костью, довольно тонкая, вкрывающая
передний сегмент баранной перепонки. Вд
роста баранной перепонки, в настоящее
время, валики среднего участка, с ост
вспомогательную поперечную рукоятки
марка. Передний граница предвращения,
также как и передний сегмент перепонки
вкрывающая ограниченное прищипкою наружна
го судаван канала и недостатка индивидуализации.
Судовые косточки не разширяются. По бокам
у верхней края баранной перепонки, по бо-
кам предвращения, валики ватной формы.
При надавливании валики валики ширины
двух раз судаван. Ступки судаван, валики
носа — незначительны.

Левое ухо не представляет ничего изыскан-
 ной, кроме существенного внимания бара-
 банной перепонки, обнаруживающегося сим-
 волически вставленным, керемкам отростка и
 какхущимся укороченный рукавтики и молоточка.
 Сурь дит без карманов без расова равен: дит
 правого уха - 0, дит левого уха - 15 сантиметр
 проводимость коестей (дит карманов без расова)
 правого уха - патерина, дит левого некарманов
 но ослаблена. Глашертонна представителю
 къ темере по отрубамому ибу земли
 симбисера симбисера урсона, такоре тирноземне
 равниааетя симва камертона, при симбисера
 ибу по отрубамому къ правому и къ левому конце
 видному отростку; симва во ибу уха.
 Таким образом отрубивается, что у Кром-
 кова ограниченное воспаление наружного слухо-
 вого прохода / otitis externa circumscripta / про-
 ступавшим барабанной перепонки / Perforatio
 tympani / травматическая прираще-
 дения, и ослабление функции слухового аппарата,
 приращеждения не только отъ ибу ибу в сре-
 дах, приращеждения звука, но судя по разубтарам
 ибу ибу камертона, обусловленными
 ибу ибу в камере лабиринта.
 На ибу ибу пероара тина убедителен
 мало находитя 2 рубля отъ ибу ибу

рашюк; рубцы бундо ровного цвета, величи-
ного от горошины до бобинного и менее ор-
да, они бобинного цвета круглого чертания,
и под покровом иль шире вымывается утолще-
ние клетчатки. Рубцы вымываются на ширину
цель широты: на нижней иль шире иль шире по-
натки, на наружной стороне иль шире иль шире
на задней части иль шире боба, на задней шире-
ней трети шире и на верхней трети предше-
ств, на правой задней поверхности шире, на
задней поверхности нижней трети правого
бедра и в подкожной впадине, на задней иль
поверхности правого бедра и голени, на передней
части груди, в шире иль шире наружного шире
ваго прохода два небольших рубца; на внутрен-
ней поверхности нижней трети иль шире бедра
находится великого в шире иль шире иль шире
ранка в бундовом шире и покрывает в
иль шире иль шире. Кроме того в верхней
трети задней поверхности иль шире бедра нахо-
дится до 50^{ти} рубцов великого в шире иль шире
верно; некоторые иль шире иль шире в шире иль шире,
темного цвета в шире иль шире иль шире
трашюк. Все упомянутые рубцы не
углубляются даже клетки. Покровитель в
клетке а также иль шире иль шире не открыва-
ется.

